

# COVID-19

## 증상 또는 노출이 있는 아동

### 평가 VDH 알고리즘



[vdh.virginia.gov](http://vdh.virginia.gov)

#### 부모 및 보호자용



\* COVID-19 **증상\***으로는 열 ( $\geq 100.4^{\circ} F$ ) 또는 오한, 피로(평소보다 더 피곤함), 두통, 근육통, 기침, 코 막힘 또는 콧물, 새로운 미각 또는 후각 상실, 인후통, 숨이 참 또는 호흡 곤란, 복통, 설사, 메스꺼움 또는 구토, 새로운 식욕 부진 또는 영양 부족.


#### 학교 및 보육 시설용



\*\* **밀접한 접촉**은 COVID-19 환자로부터 6 피트 이내에서 15 분 또는 그 이상 긴 시간 동안 함께 있었거나 직접 호흡기 분비물에 대한 노출이 있는 경우를 의미합니다.

\*\*\***지난 14 일 동안 인구 100,000 명당 50 건 이상 사례 지역** 정보는 [여기를](http://vdh.virginia.gov)

클릭하십시오. [www.vdh.virginia.gov/coronavirus/key-measures/pandemic-](http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/key-measures/pandemic-)



## 의료 제공자용



◆검사 - PCR 또는 항원 (Ag) 검사가 허용됩니다. Ag 검사가 음성이고 COVID-19에 대한 임상적 의심이 높으면, PCR로 확인하십시오. 이상적으로는 초기 Ag 테스트 2 일. PCR 검사를 사용할 수 없는 경우, 임상 환자 분리를 권장할지 여부는 재량에 따라 사용할 수

### COVID-19 \* 증상이 있는 아동을 위한 임상 평가

[www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html](http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html)

지난 14 일 동안 인구 100,000 명당 50 건 이상의 발생 사례\*\*\*가 있는 지역과 알려진 미저하 접촉\*\*\* 미 노출 여부

지난 14 일 동안, 인구 100,000 명당 50 건 이상의 사례\*\*\*가 발생한 지역에 노출

지난 14 일 동안 COVID-19 로 알려 지거나 의심되는 사람과의 밀접한 접촉\*\*\*

대체 진단을 고려하십시오. 검사□ 그리고 COVID-19 에 대한 배제는 임상적 의심 수준 및 검사 가능성에 따라 고려될 수 있습니다.

COVID-19 검사□ (및/또는 임상적으로 평가). 집에서 분리하십시오.

증상이 있는 경우 즉시 또는 COVID-19 에 대해 노출 가능성이 있고 약 1 주 후 COVID-19 테스트□ 증상이 없는 경우, 집에서 분리/격리합니다.

증상이 호전되고 아이가 해열제를 사용하지 않고 최소 24 시간 동안 열이 없는 경우, 학교/보육 시설로 복귀할 수 있습니다.

음성 COVID-19

양성 검사 또는 COVID-19 진단

음성 COVID-19 또는 검사하지 않음

## 로 돌아가기 학교와 보육 시설



### 임상 평가가 수행되지 않은 경우

증상이 있지만 밀접한 접촉 \*\*이 없고 지난 14 일 동안 >100,000 명당 50 건 이상의 발생 사례\*\*\*가 있는

증상 및 밀접한 접촉 \*\*이 있거나 지난 14 일 동안 100,000 명당 50 건 이상의 사례\*\*\* 발생 지역에 노출 10 일 간의 자가

증상은 없지만 밀접한 접촉 \*\*이 있음.

증상 발병 후 10 일 동안 가정 분리 (또는 양성 판정일 테스트). 밀접 접촉자들을 격리합니다.

마지막 노출 후 14 일 동안 분리하거나 증상 발병 10 일 후

해열제 없이 24 시간 동안 열이 없는 경우 복귀합니다.

10 일 간의 자가 분리. 그런 다음 해열제 없이 24 시간 동안 열이 없는 경우 복귀합니다. 밀접 접촉자들을 격리합니다.

14 일 자가 격리. 증상이 없으면, 15 일째에 복귀. 증상이 나타나면 10 일 동안 분리하고 밀접 접촉자들을 격리합니다.

10 일 분리 후, 최소 24 시간 동안 열이 나지 않고 증상이 호전되면 아동은 학교 및/또는 보육 시설로 돌아갈 수 있습니다.

증상이 나타나면, 재검사를 고려하십시오. 증상 발병 후 10 일 동안 집에서 분리합니다. 밀접 접촉자들을 격리합니다.

증상이 나타나지 않으면 학교 및/또는 보육시설로 15 일째에 돌아갑니다.